

Säuglinge

Kinder und Jugendliche

		8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen	20 Wochen	12 Monate	13-15 Monate	5-7 Jahre 1. Primar	7-9 Jahre 3. Primar	11-13 Jahre 1. Sekundar	15-16 Jahre 3. Sekundar	15-17 Jahre 5. Sekundar
Kinderlähmung	6-fach Impfung	😊	😊	😊			😊					
Diphtherie Tetanus Keuchhusten		😊	😊	😊			😊	😊				😊
H. Influenzae B		😊	😊	😊			😊					
Hepatitis B		😊	😊	😊			😊					
Masern, Mumps, Röteln	Kombi- Impfung					😊			😊			
Meningokokken ACWY ⁽¹⁾							😊				😊	
Pneumokokken ⁽²⁾		😊		😊		😊						
Rotavirus ⁽³⁾	Schluck- impfung	😊	😊	😊								
Humane Papilloma Viren (HPV) ⁽⁴⁾										😊		

Kinder + Jugendliche

Kaleido impft nach Schuljahr und nicht nach Alter. Es kann also sein, dass ein Kind im 1. Schuljahr 5, 6 oder 7 Jahre alt ist.

⁽²⁾ Pneumokokken

3 Dosen. Bei Frühchen (< 37 Wochen): 4 Dosen.

⁽¹⁾ Meningokokken ACWY

Frühchen (<37 Wochen) erhalten die Impfung mit 13 Monaten.

⁽³⁾ Rotavirus

2 oder 3 Impfungen - je nach Impfstoff. Nicht kostenfrei.

⁽⁴⁾ Humane Papilloma Viren (HPV)

2. Dosis nach 6 Monaten.

Alle anderen erhalten die Impfung mit 15 Monaten.