



- Halten Sie immer die **Verabreichungshäufigkeit** ein, die vom Arzt verschrieben wurden bzw. in der Packungsbeilage oder vom Apotheker empfohlen wird.
- Verabreichen Sie **nicht gleichzeitig mehrere Arzneimittel** gegen das Fieber.

Arzneimittel mit unterschiedlichen Markennamen können nämlich den gleichen Wirkstoff enthalten. Dadurch könnten Sie Ihrem Kind zu viel davon geben (mögliche Überdosierung).

Bei einer sehr hohen Temperatur (z. B. über 39,5° C), die trotz Verabreichung von Paracetamol nicht sinkt, kann Ihr Arzt dem Kind ein Arzneimittel auf Ibuprofen-Basis verschreiben, das zwei Stunden nach dem Paracetamol verabreicht wird. Halten Sie sich genau an die ärztliche Vorschrift. Geben Sie auch Ihrem Kind ausreichend zu trinken. Sie können ihm außerdem ein lauwarmes, mindestens 15 minütiges Bad geben, vor allem wenn Ihr Arzt Ihnen dies bereits empfohlen hat.

- Verabreichen Sie Ihrem Kind **möglichst kein Aspirin** (Acetylsalicylsäure), um das Fieber zu bekämpfen.

Die Anwendung von Aspirin bei bestimmten viralen Erkrankungen könnte nämlich das Reye-Syndrom auslösen. Dieses sehr seltene Syndrom kann schwere Folgen haben, unter anderem einen Leberschaden.



### SIE WÜNSCHEN WEITERE INFORMATIONEN?

Gehen Sie auf die Website  
[www.medicamentsetenfant.be](http://www.medicamentsetenfant.be)

### SEIEN SIE IMMER VORSICHTIG UND AUFMERKSAM, WENN SIE EINEM KIND EIN ARZNEIMITTEL GEBEN



**Föderale Agentur  
 für Arzneimittel  
 und Gesundheitsprodukte  
 (faag)**

Eurostation II  
 Platz Victor Horta 40/40  
 1060 BRÜSSEL

T + 32 2 528 40 00

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Hrsg.: Xavier De Cuyper, Generalverwalter der faag - © faag 2013

# FIEBER



**Ihr Kind hat Fieber?  
 Wann braucht es ein Arzneimittel?**



Ihre Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, unsere Sorge



**BEIM KIND MUSS FIEBER NICHT NOTWENDIGERWEISE MEDIKAMENTÖS BEKÄMPFT WERDEN. DIE VERABREICHUNG EINES ARZNEIMITTELS IST JEDOCH MANCHMAL NOTWENDIG.**



## WAS IST FIEBER?

Fieber ist eine ungewöhnliche Erhöhung der Körpertemperatur. Es ist keine Krankheit, sondern eine **natürliche Reaktion** des Körpers, wenn er gegen eine Infektion kämpft. Wenn Ihr Kind Fieber hat, muss es **nicht automatisch** ein **Arzneimittel** erhalten. Manchmal ist ein Arzneimittel jedoch notwendig.

## IHR KIND HAT FIEBER? WAS SOLLTEN SIE TUN?

Unabhängig vom Alter Ihres Kindes sind die ersten Maßnahmen immer:

- geben Sie Ihrem Kind regelmäßig und ausreichend **zu trinken**,
- **decken** Sie es **nicht zu sehr zu**,
- achten Sie darauf, dass die **Zimmertemperatur 20° C nicht überschreitet**.

### Spezifischer Fall von jungen Kindern, die bereits Konvulsionen (Anfälle) hatten.

Vermeiden Sie immer ein Ansteigen der Temperatur bei Ihrem Kind: sobald die 38° C überschritten sind, geben Sie ihm ein Arzneimittel gegen Fieber.

### Was sollten Sie tun, wenn die Temperatur Ihres Kindes 38,5° C überschreitet oder wenn es sich sehr unwohl fühlt?

Unabhängig vom Alter wird empfohlen, unverzüglich ein fiebersenkendes Arzneimittel zu geben.

## WANN SOLLTEN SIE EINEN ARZT KONSULTIEREN?

Das Fieber sollte stets entsprechend dem Alter des Kindes bewertet werden.

### Neugeborenes und Säugling unter drei Monaten, mit einer Temperatur über 38° C.

Gehen Sie sofort zum Arzt.

### Säugling bis zu zwei Jahren, der sich noch nicht klar ausdrücken kann.

Gehen Sie zum Arzt, wenn:

- sein **Allgemeinzustand alarmierend** ist: er ist quengelig, er wimmert, er fühlt sich scheinbar unwohl, usw,
- er zeigt einen (oder mehrere) **ungewöhnliche(n) Symptom(e)** : Ausschlag, Erbrechen, usw.
- trotz Einnahme eines richtig dosierten Arzneimittels gegen Fieber **sinkt die Temperatur nicht**.

### Älteres Kind, das sich klar ausdrücken kann.

Gehen Sie zum Arzt, wenn:

- es über **starke Schmerzen** klagt, z. B. heftige Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen,
- die **Temperatur über 39° C** liegt und trotz der Einnahme eines richtig dosierten Arzneimittels gegen Fieber **nicht sinkt**.

## WENN DIE VERABREICHUNG EINES ARZNEIMITTELS GEGEN FIEBER NOTWENDIG IST, WORAUF SOLLTEN SIE ACHTEN?

Indem Sie die Temperatur senken, lindern die Arzneimittel die unangenehmen Wirkungen des Fiebers, beseitigen jedoch nicht dessen Ursache.

Allgemein wird beim Kind Paracetamol als erstes Mittel gegen Fieber eingesetzt. Andere Arzneimittel wie Ibuprofen können ebenfalls verwendet werden.

- Lesen Sie die **Packungsbeilage** aufmerksam durch, bevor Sie eines dieser Arzneimittel verabreichen.
- Befolgen Sie peinlich genau die **Dosierungen**, die vom Arzt verschrieben wurden bzw. in der Packungsbeilage oder vom Apotheker empfohlen werden.

Diese Dosierungen müssen **eher dem Gewicht des Kindes als seinem Alter angepasst** werden. Bitte verwenden Sie die dem Arzneimittel beigefügte Dosierungshilfe (Löffel, Spritze, Pipette, usw.).

